

COVID: EFFICACIA DOSE BOOSTER INIZIA A DIMINUIRE DOPO DUE MESI

8 Marzo 2022



ROMA - La protezione dei vaccini di richiamo contro la variante omicron inizia a diminuire dopo due mesi.

A sostenerlo, i ricercatori dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito.

Gli esperti hanno esaminato oltre un milione di persone infettate dalla variante delta o omicron di Covid-19 nel Regno Unito, tra il 27 novembre 2021 e il 12 gennaio 2022, il periodo in cui la variante omicron ha iniziato a diffondersi.

I ricercatori hanno esaminato se le persone avevano sviluppato una malattia lieve ma non se fosse ricoverato in ospedale o meno.

I risultati, pubblicati su The New England Journal of Medicine, confermano che una dose di richiamo aumentava sostanzialmente la protezione contro lo sviluppo di malattie lievi dalla variante omicron. Due dosi del vaccino Pfizer/BioNTech erano efficaci solo per l'8,8% contro la variante omicron dopo 25 o più settimane. Ma una terza dose di richiamo di questo vaccino ha aumentato la protezione al 67,2%. Tuttavia, questo valore è sceso al 45,7% dopo 10 o più settimane.

Un richiamo di Moderna, somministrato a coloro che avevano ricevuto due dosi iniziali del farmaco Pfizer, è risultato efficace del 73,9% contro la malattia lieve della variante omicron dopo due o quattro settimane. Questo è poi sceso al 64,4% dopo cinque-nove settimane.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli