

LANCIANO: SINDACO FIRMA ORDINANZA PER LOTTA A PROCESSIONARIA

10 Marzo 2019



CHIETI – Il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ha firmato un’ordinanza che impone ai privati proprietari e agli amministratori di condominio che gestiscono aree verdi di contrastare la presenza della “processionaria del pino” (nome scientifico *Traumatocampa pityocampa*), particolare tipo di farfalla che costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute di persone e animali.

Il bruco di questo lepidottero è dotato di una peluria urticante che può provocare irritazioni cutanee, oculari e alle vie respiratorie quando è allo stato larvale. Necessarie quindi le opportune verifiche e ispezioni sugli alberi per accertare la presenza di nidi, con obbligo di rimozione e distruzione degli stessi come stabilito dal Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007. Particolare attenzione quindi alle specie di alberi pino silvestre (*Pino sylvestris*), pino nero (*Pino nigra*), pino strobo (*Pinus strobus*), e le altre aghifoglie in genere. Nel caso in cui si riscontrasse la presenza di nidi di processionaria del pino, proprietari e amministratori di condominio dovranno immediatamente rivolgersi a ditte specializzate per la rimozione e la distruzione dei nidi e l’attivazione della lotta guidata come da disposizioni dettate dalla Regione Abruzzo.

A lavori ultimati è necessario comunicare l’esito della bonifica al Settore Ambiente – Ufficio Igiene Sanita del Comune di Lanciano e al Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanita Pubblica (SIESP) della Asl 2 Lanciano Vasto Chieti. Sanzioni per i trasgressori dell’ordinanza, su cui sono chiamati a vigilare Carabinieri Forestali e Polizia Municipale, dai 500 ai 3000 euro. Previsti interventi rapidi dove sono stati già identificati nidi poiché è necessario agire sui bozzoli per una soluzione efficace. La Regione Abruzzo indica due procedure: meccanica, con sportazione e bruciatura dei rami con nidi entro marzo; microbiologica (*bacillus thuringiensis*), contro larve di prima e seconda età da fine agosto a tutto settembre. Consigliabile l’impiego, in giugno e luglio, di trappole a feromoni per il monitoraggio dei voli e/o la cattura in massa di insetti adulti.